

165

L'Académie n'en fera point usage, l'ayant
donné au journal de médecine

Monsieur

Je vous prie de présenter à Messieurs
de l'Académie Royale de Chirurgie, mes
très humbles remerciements, de la bonté
qu'ils ont eue de m'honorer du caractère
de leur correspondant, je saisirai avec
bien de l'empressement toutes les occasions
qui pourront servir à leur prouver mon
entier dévouement, et combien je suis
attaché aux progrès de la gloire; et
de la confiance qu'ils se sont acquises
chez tous les peuples de la terre.

Je crois ne pouvoir faire mieux
mon cour à ces Messieurs qu'en leur
faisant part du traitement d'une

ARC 46 n° 37



plorie de feu qui a été suivie d'un —
heureux succès.

observation
d'un coup de balle au bras, avec —
avec fracas de l'humérus —

pour m: Navaton chirurgien major de
l'hospital Royal, et militaire de London, —
pensionnaire du Roy; et correspondant
de l'Académie Royale de chirurgie.

Le 11. fevrier 1757: le nommé daniel
Heber soldat au Regiment de la marck —
compagnie de muntz, entra dans ce
hospital; il venoit de recevoir un coup
de feu d'accident; qui lui fracassoit le
bras gauche dans sa partie moyenne
Inférieure; la balle avoit son entrée,
antérieurement, Environ quatre poulces —
au dessus de son articulation avec —

L'avant Bras, et sa partie postérieure
à la même hauteur, de manière que le
Bras étoit pressé au milieu de son diamètre.

Comme la Balle entraîne toujours
avec elle les Esquilles du côté de sa sortie;
et que cette plaie en plus grande: J'y
introduisis mon doigt pour reconnoître
l'état de la maladie; je trouvoy d'abord
nombre d'esquilles d'un volume
modique, qui occupoient le trajet de
la Balle; la partie Inférieure de
l'humérus divisée en deux grosses portions,
l'une vacillante, et l'autre conservant
sa continuité avec les condyles de
l'articulation; à la partie Supérieure
il y avoit également deux très grandes
Esquilles séparées de l'os principal
Tout ceci bien reconnu, je crus —



ne pouvoir me dispenser de faire
L'ampputation du bras; et J'y Incliné
Beaucoup; mais l'âge d'environ 22 ans,
et la bonté du tempérament du blessé
me déterminèrent à tenter de le
conserver.

Je fis tout de suite une Incision —
médiane à la plaie postérieure, pour
faciliter l'extraction des esquilles, J'en
tirai neuf du volume d'une demi noisette;
Je mis de niveau les grandes esquilles que
j'avois reconues à la partie supérieure, et
à l'inférieure, et les arrajetis, ainsi que
tout le bras, avec deux ételles semi concaves,
garnies de chapeau carton en dedans; et
placés aux parties latérales du bras,
qui laissoient les deux plaies à decouvert,
pour la facilité des pansements; et —
l'écoulement de la matière de la supuration.

J'ajustai ses atelles par le secours d'une
bande étroite; médiocrement serrée:
mis du charpy sur les plaies
pour arrêter le sang & l'hémorragie qu'il
j'avoit, et sur le tout un grand
emplâtre de diachillon gommé.

Je placai toute cette extrémité
sur un oreiller de cone d'orge; l'avant
bras un peu plié; et plus élevé que
le bras: je fis faire trois saignées du
bras à mon malade dans les premiers
24 heures; lui vuider le ventre par
un Lavement; et le mis à une diète
severe.

L'endemain il parut du gonflement
au bras; et à l'avant bras; qui me
fit de lâcher le bandage: Le 3.^e jour
le gonflement augmenta si considérablement.



qu'il se forma plusieurs flictaines que
j'ouvris; ce qui me déterminas dotee —
d'emplâtre, de nen laisser sur les plaies
que ce qui en falloit pour couvrir la
chirurgie; et je lui substituai le cataplasme
de mie de pain, précédé d'une imbrogation
de Beurre de Rotendues. ce traitement
repeté deux fois par jour fut continué
les jours suivants.

Le pouls qui avoit été concentré des
le commencement se développa; le cinq
il parut de la fièvre: je lui ordonnai
quatre paquets de poudres diaphoretiques
simples, a prendre dans des bouillons, —
pour adoucir les aigres de l'estomach,
et faciliter la transpiration; et continuai
de tenir le ventre libre.

Le huit la suppuration parut établie

de façon que les Emplois de diachilum
gommé qui soutenoient la Charpy que
j'avais mis sur les plaies, en furent
détachés: Je fis alors un premier
pansement general; j'employai sur les
plaies un digestif composé de Jeune
d'œuf, de theriacale de venise; de Beurre
d'arsens; d'onguent Basilicum & chaque
partie égale, et de suffisante quantité
d'huile d'Hypericum pour rendre ce
remède de consistance convenable: Je
soutins les plumaceaux avec l'emplâtre
de diachilum gommé; renouvelai les
ételles; et quoique le gonflement me
parut diminué je continuai l'usage du
cataplasme appliqué sur toute l'extrémité;
mais je jugai à propos d'abréger de suite
de quelque chose la portion du cataplasme
qui couvroit l'avant bras.



La fièvre disparut le dix, et fut sans
retour; le docteur je commençai à donner
à manger à mon malade qui sembloit
d'un état de faiblesse; le quinze je cessai
l'usage du cataplasme, et l'enveloppai
toute l'extrémité du mélange des
emplâtres de diachylum gommé;
decumin, et de diasulphure, des quels
je me sers dans tous ces cas avec
succès; parce qu'ils augmentent les
suppurations; ouvrent les pores de la peau,
et excitent une transpiration, ou moiteur,
qui concourt à dégorger les parties; et à
tenir la peau flexible, et relâchée.

Les suppurations ont été fort abondantes
le premier mois, elles ont entraîné deux
très petites loquilles qui avoient
échappé à mes premières recherches.

Le gonflement inflammatoire qui

avoit d'abord paru blanc devenu, molaire,
blanchâtre, et comme oedémateux; je
couvris l'avant bras de compresses —
trempées dans l'eau d'argemone, —
mais je continuoj obstinément —
l'application de l'emplâtre sur toute
les parties dures.

Le 35.^e Jour les supurations —
commencerent à diminuer: l'oplaie
antérieur ne fournissoit que très peu —
de matière, et ses bords parvinrent à
se rapprocher; je pris ce moment pour
faire quelques injections, pour laver
et évacuer la matière de la supuration.
que je soubrainois séjourner entre
l'interstice des feutes des os: cette —
injection étoit composée d'une infusion
de plantes vulnérables; de miel Roser.



et d'une petite partie d'un d'anguinade.
Je les cesserai peu de jours après, par
la crainte que jeus de détraquer, et
entraîner le Sue osseux qui paroît
commencer à se repandre pour couvrir
le bout des os les uns avec les autres; parce
que si avois aperçu une sorte de solidité
en faisant lever le bras au blessé.

Je lui conseilloy aussi de fléchir, et
étendre doucement, et sans violence
l'avant bras pour briser, et atténuer
le Sinovie: de peur que si elle venoit
à se resserrer elle renkilerait cette
articulation.

Le 48.^e Jour il parut un petit
dépôt cutané, à la partie moyenne
l'externe du bras, au milieu de l'espace
des deux plaies: comme en pressant

ce depot la matiere se vuider —
pour la plaie postérieure, & en fin
point d'ouverture, et de le terminer
par la plication de compresses —
Expulsives: Les plaies sont dans ce
moment à Cicatriser: Le gonflement
oedémateux en beaucoup diminué;
des légers purgatifs que je lui donne
de temps en temps contribuent à —
degorgier toutes ses parties: Mon —
malade se leve tout les jours: le bras
assurmi d'une feuille de fer blanc —
concave, qui remplace très bien les
attelles: Le tout soutenu d'une —
charpe: La flexion; et l'extension
de l'avant bras s'exécute assez bien;
L'union des os est ferme, et solide.



Il se compte les voir sortir —
Mecumment de l'hôpital bien guéri,
Le bras un peu raccourci, et son —
mouvement gêné pour quelque
temps.

M. M. Les chirurgiens Majors —
de cette garnison, ont suivi fort —
exactement les pensements de ce
Général; et se sont accordés à convenir
que la Chirurgie a peu d'exemples
qu'un Blessé de cette conséquence
se soit terminé si heureusement; et
en deux mois de temps.

Reflection

L'expérience me souvent appris
que les grandes incisions sont —
nuisibles aux plaies d'feu crues
fractures des os des bras, et des jambes:

Sur tous-fois que l'entrée de la balle,
ou après de sa sortie, c'est à dire que
la partie a été perçue par la route
la plus courte; tout par ce quelles
augmentent les douleurs; les hémorragies,
et les supurations sans nécessité; que
par ce quelles donnent une libre issue
au suc blanc qui se renche et
continuellement pour souder les os les
uns avec les autres: c'est pour quoy il
arrive que trop souvent après
des poussements très longs, et très
penibles, les os ne sont pas réunis
on est forcé de venir à l'amputation.

Les incisions doivent toujours être
faites de la partie la plus declive, —
ayant égard à la situation que
la plume doit avoir le malade étant
couché; elles doivent être dirigées.



Suivant la rectitude des fibres; ou —
les plis de la peau. En suffisante —
pour permettre l'extraction des —
Esquilles; et rien de plus: on doit
preferer de les faire à l'endroit de la
sortie de la balle autant qu'il est
possible; parce qu'elles entraînent
toujours avec elles les portions des
quelles ont été détachées, et qu'on a
peu concevoir plus de facilité
de les tirer.

Les raisons qui engagent bien —
des chirurgiens à faire des grandes —
incisions dans les fractures des os, est
qu'ils croient qu'elles préviennent, —
empêchent; ou diminuent ces —
inflammations; les fuzés, ou les dépôts,

qui les accompagnent toujours ; mais
l'expérience prouve le contraire d'une
façon si forte, et si convainquante
qu'on ne peut se refuser à son
Evidance.

L'usage des Espritueux qu'on a
Employés jusqu'à nous, pour le
traitement des plaies de feu, étoient
cause de la plus grande partie de
ses accidents.

Celui des Emolients produisent
des effets si salutaires qu'on doit leur
donner la préférence : et se départir
de l'usage des grandes Incisions —
l'expérience me le confirme tous
les Jours.

J'espère que messieurs de
l'Académie ne désapprouveront pas



que je joigne ici un second fait
également intéressant.

observation 2.

d'un coup de feu au travers
de la main avec fracas d'or.

Le 28. février 1757: le nommé Frederich -
grismayer, soldat au Regiment de la
marck, Compagnie de mâtés, entra
dans cet hôpital; il étoit en sentinelle
de sa main gauche imprudemment
appuyé, sur le bout de son fusil; le coup
partit; et lui passa au travers de la
main: je l'examinai, et trouvai que
l'os du carpe qui soutient le doigt du -
mitten avoit été fracassé; l'entrée de la
balle étoit fort étroite; sa sortie au dessus
de la main fort large: je ne fis point
d'incisions: j'enlevai avec la pince

des circons cinq Esquilles qui étoient
encore adhérentes à quelques portions de
membranes: Les tendons, et les nerfs qui
étoient renfermés sur le trajet de la
Balle avoient été également déchirés: mes
pensées furent dirigées comme
dans la observation précédente; et parut
du gonflement, une douleur très aigue
à l'articulation du poignet: la fièvre
Salutaire: je combattis ces accidents par
cinq saignées du bras, des Lavemens, une
diète très severe; et l'application des
cataplasmes de mie de pain précédés
de l'ambrocatie de Bureau de Rolandus,
et après ceux-ci, le mélange des Emplâtres
de diachilum gommé, de cummin; et de
diaculphuris, qui couvroient la main, et
tout l'avant bras.

La fièvre se calma, ainsi que les



douleur; et le gonflement; la foliation
des tendons, et des nerfs se fit du 12; au
14, celles des os du 27; au 30: par
l'application continuée des pommades —
J'employai après des purgatifs de loin
en loin pour aider à dégorger les parties.

La plaie du crâne de la main, qui
étoit celle d'entrée de la balle; fut
cicatrisée le 32. celle du dos de la main
fut finie hier 10 du courant, de façon
que ce blessé a été guéri en 42 jours.
Les articulations des doigts; et celle du
poignet sont encore engourdis; un
peu gonflés; et leurs mouvements gênés;
ce qui se rétablira en peu de temps.

J' prie Monsieur Moran d'agréer
que je profite de cette occasion —

pour l'assurance de ma reconnaissance,
de mon entier dévouement, & du —
profond respect avec lequel je serai
toujours Monsieur

Vostre très humble
et très obéissant serviteur
Rowatton

à Londres le 11^e avril 1757.



